

Trenažér pastózního (vytlačitelného) otoku-s stupně



Popis

Součástí posuzování stavu pacienta je sledování otoků na končetinách. Otoky jsou důsledkem abnormální akumulace tekutiny intersticiálních prostorách tkáně. Stisknutí takového povrchu kůže může zanechat důlek, která se po uvolnění tlaku ihned nenavátí. Takový důlek je znám jako pastózní (vytlačitelný) otok. Pastózní otok je hodnocen subjektivním pozorováním hloubky a doby trvání důlku. Tento trenažér využívá realistickou umělou tkáň pro demonstraci stupně 1+ až 4+.

- Stupeň 1+ - mírný důlek, mírné prohloubení (2 mm), žádné znatelné zduření oblasti
- Stupeň 2+ - střední důlek, prohloubení (4 mm) rychle klesá
- Stupně 3+ - hluboký důlek, prohloubení (6 mm) na krátkou dobu zůstane, oblast vypadá opuchnutá
- Stupeň 4+ - velmi hluboký důlek, prohloubení (8 mm) trvá dlouhou dobu, oblast je velmi opuchnutá

Možnost nácviku:

- posouzení stupně (1+ až 4+)
- posouzení hloubky (2 mm - 8 mm)
- posouzení doby návratu pokožky do výchozího stavu

Obsahuje: 4 tkáňové podložky představující jednotlivé stupně, vylisovaný podstavec, instrukce, krabice.