


Model poranění chodidla "Wilma"



Popis

Anatomický model chodidla s ranami „Wilma™“ byl vytvořen podle chodidla osmdesátiletého pacienta. Tento model názorně demonstruje dvacet různých poranění a umožňuje pochopit rozdíly mezi nimi. Velký důraz byl kladen na ruční malbu jednotlivých ran tak, aby věrně odpovídaly skutečnému vzhledu u pacienta a zajistily tak co nejrealističtější simulaci. Jakmile jsou různé etiologie pochopitelné, lze je prodiskutovat a navrhnout léčebný plán, který zajistí optimální péči o pacienta. Model je vyroben z pružného materiálu, který umožňuje pohyb prstů na nohou pro bližší vyšetření nebo aplikaci obvazů. Tento unikátní materiál umožňuje aplikaci a odstraňování obvazů bez zanechání zbytků lepidla, pokud se používá podle dodaných pokynů. Každý model VATA je dodáván s polohovací základnou pro chodidlo, která umožňuje bezdotykový přístup ke všem místům při aplikaci obvazů nebo pro výuku. Tento simulační model je účinným nástrojem pro vzdělávání zdravotnických pracovníků a pacientů v identifikaci ran, vyšetřovacích metodách ran a jejich pravděpodobných etiologiích. Rutinní čištění a výměnu obvazů se s tímto modelem mohou učit poskytovatelé zdravotní péče, pacienti, rodiny a pečovatelé.

Na modelu Wilma™ Wound Foot jsou znázorněny následující nálezy:

- Dekubit 1. stupně na vnitřním kotníku (mediálním malleolu)
- Dekubit 2. stupně na laterální straně chodidla (za 5. prstem)
- Dekubit 3. stupně na patě s infekcí
- Dekubit 4. stupně na vnějším kotníku (laterálním malleolu) s obnaženou šlachou a kostí (s osteomyelitidou)

Dekubit 4. stupně na vnitřní straně chodidla (za palcem) s obnaženou šlachou a nekrotickou tkání
Dekubit hlubokých tkání (DTPI) na nártu, na pohmat měkký a houbovitý
Nekrotický příškvár (eschar) neurčitelného stupně na boční straně chodidla
Vřed zasahující do celé tloušťky kůže, plantární strana, 1. prst, pravděpodobná diabetická neuropatická etiologie
Mozol pod 4. metatarzofalangeálním kloubem
Amputovaný 2. prst
Suchá gangréna 5. prstu v důsledku ischemie
Interdigitální macerace mezi 4. a 5. prstem
Rány zasahující do části tloušťky kůže (partial-thickness) mezi 3. a 4. prstem v úrovni 1. kloubu
Kuří oko na hřbetu 3. prstu
Mozol na špičce 3. prstu
Zarostlý nehet na vnitřní straně palce
Ztluštělý nehet na palci postižený plísni
Puchýř na palci v úrovni prvního kloubu
Kladívkové prsty - 3., 4. a 5. prst
Rána sešitá kožními svorkami